

Okamžitá opatření při poranění se o použitou injekční jehlu

- Bezprostředně po poranění nechte ranku co nejdéle volně krváčet. Krvácení totiž sníží dávku viru.
Ranku nemačkejte!
- Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete dezinfekčním roztokem – nejlépe Jodisolem nebo 0,2% Persterilem. Tyto roztoky mají antiseptický a protivirový účinek.
- Co nejdříve vyhledejte praktického lékaře, lékaře Zdravotního ústavu, event. Krajské hygienické stanice nebo se přímo obraťte na nejbližší infekční oddělení nemocnice s poliklinikou.

Všeobecná opatření

- Objevíte-li někde pohozenou použitou injekční jehlu a stříkačku, zásadně se jich nedotýkejte a nález ihned oznamte Policii ČR nebo Městské policii (bezplatná telefonní linka **158** nebo **156**), která zabezpečí jejich bezpečnou likvidaci prostřednictvím vyškolených osob.
- V případě nálezu injekční jehly a stříkačky v hromadném dopravním prostředku uvědomte průvodčího nebo řidiče.
- S použitými injekčními jehlami a stříkačkami se manipuluje pouze pomocí vhodného nástroje, např. pinzety nebo kleští, a poté se ukládají do pevného obalu s uzávěrem.

Použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční odpad a neměly by se dostat na volně přístupná prostranství.